



Scarlet Fever (Scarlatina)

What is it?

- A bacterial illness that develops in some people who have Strep Throat.
- A bright red rash that covers most of the body, strawberry tongue, flushed face, swollen or tender glands in the neck. May also have nausea or vomiting, headache, and fever.

How is it spread?

- The bacteria spreads via droplets, when an infected person coughs or sneezes.

What should I do?

- Take children suspected of having Strep Throat or Scarlet Fever to a health care provider as soon as possible.
- Always finish the entire course of antibiotics as prescribed.
- Student may return to school after at least 12 hours of antibiotics as long as they have had no fever (over 100 degrees) for 24 hours *without* receiving medication for fever (such as Ibuprofen or Acetaminophen).
- Wash hands frequently with soap and warm water and teach children to cover their mouths and noses when sneezing or coughing with a disposable tissue if possible or with a shoulder.
- Consider replacing your child's toothbrush after being treated for Strep Throat.

Reference: Group A Streptococcal Disease (Centers for Disease Control and Prevention, 2022)



Fiebre escarlata (escarlatina)

¿Qué es?

- Una enfermedad bacteriana que se desarrolla en algunas personas que tienen amigdalitis estreptocócica.
- Una erupción roja brillante que cubre la mayor parte del cuerpo, lengua con apariencia de fresa, rubor facial, glándulas inflamadas o sensibles en el cuello. También pueden tener náuseas o vómitos, dolor de cabeza y fiebre.

¿Cómo se propaga?

- La bacteria se propaga a través de gotitas, cuando una persona infectada tose o estornuda.

¿Qué debo hacer?

- Si sospecha que un niño tiene amigdalitis estreptocócica o escarlatina llévelo con un médico tan pronto como sea posible.
- Siempre termine todo el régimen de antibióticos prescrito.
- El estudiante puede regresar a la escuela después de al menos 12 horas de antibióticos siempre y cuando no haya tenido fiebre (más de 100 grados) durante 24 horas *sin* el uso de medicamentos para controlar la fiebre (como ibuprofeno o acetaminofén).
- Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón y enseñe a los niños a cubrir su boca y nariz al estornudar o toser con un pañuelo desechable si es posible o con su hombro.
- Considere reemplazar el cepillo de dientes de su hijo después de recibir tratamiento para la amigdalitis estreptocócica.

Referencia: Estreptococo del grupo A (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2022)